

ACANTO[®]

Fungicida a largo spettro per frumento (tenero e duro), orzo e riso.

Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: Gruppo 11 (FRAC)

ACANTO[®]

Composizione

Picoxystrobin puro g 22.52

(=250 g/L)

Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Phyteurop – Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne Montreuil
Bellay (France)

Registrazione N°14818 del 21/12/2011 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10



ATTENZIONE

PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

- a) **Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca e tenerlo a riposo. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico in via preventiva.
- b) **Contatto con la pelle:** togliere prontamente gli indumenti contaminati direttamente a contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- c) **Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- d) **Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione:

ACANTO è un fungicida ad ampio spettro per il controllo di numerose malattie fungine di frumento, orzo e riso. ACANTO è dotato di attività sistemica e translaminare e possiede una significativa azione di vapore. ACANTO deve essere applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

Frumento (tenero e duro) ed orzo: per il controllo di Ruggini, Septoria, Oidio, Nerume, Elmintosporiosi e Rincosporiosi applicare **1 l/ha** di ACANTO disciolto in 200-500 litri di acqua. Effettuare 1 o 2 applicazioni per anno intervenendo nel periodo compreso fra inizio levata e fioritura. Rispettare un intervallo minimo di 21 giorni fra le applicazioni.

Riso: per il controllo di Brusone ed Elmintosporiosi applicare **1 l/ha** di ACANTO disciolto in 200-400 litri di acqua. Effettuare 1 applicazione per anno intervenendo nello stadio di botticella. Applicare solo con la risaia in asciutta. Dopo l'applicazione, in caso di immissione di acqua, questa deve rimanere ferma all'interno della camera per un periodo di almeno 5 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di ACANTO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'aggitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare il prodotto secondo le linee guida FRAC e in particolare:

- ACANTO deve essere applicato preventivamente
- Su frumento e orzo ACANTO deve essere sempre impiegato in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione
- Il numero massimo di applicazioni di ACANTO è di 2 per anno per il frumento e l'orzo e 1 per anno per il riso
- ACANTO contiene picoxystrobin, una strobilurina appartenente al gruppo dei QoI. E' consigliabile alternare l'utilizzo di ACANTO con prodotti con differente modo d'azione

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e riso.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10.04.2015

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].