



**THIS CHANGES
EVERYTHING**



**UNA MIGLIORE GESTIONE
DEL VIGNETO
PER UN BUSINESS
DI QUALITÀ**

**DuPont™
Zorvec Zelavin® Vel**
disease control

**DuPont™
Zorvec Zelavin® Bria**
disease control



Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria: indicazioni d'etichette

Prodotto	Zorvec Zelavin® Vel	Zorvec Zelavin® Bria
Componenti	Zorvec®: marchio registrato della sostanza attiva <i>Oxathiapiprolin</i> Movida®: marchio registrato del prodotto contenente <i>Zoxamide*</i>	Zorvec®: marchio registrato della sostanza attiva <i>Oxathiapiprolin</i> *Flovine®: marchio registrato del prodotto contenente <i>Folpet</i>
Meccanismo d'azione di Zorvec Zelavin®	OSBPI (inibitore della proteina OSBP legante l'ossisterolo)	
Classificazione FRAC	Zorvec Zelavin®: Gruppo 49 (F9) Movida®: Gruppo 22	Zorvec Zelavin®: Gruppo 49 (F9) Flovine®: Gruppo M4
Formulazione	Zorvec Zelavin®: Dispersione oleosa (OD) Movida®: Sospensione concentrata (SC)	Zorvec Zelavin®: Dispersione oleosa (OD) Flovine®: Granuli idrodispersibili (WDG)
Composizione	Zorvec Zelavin®: 10% Movida®: 24%	Zorvec Zelavin® (<i>Oxathiapiprolin</i>): 10% Flovine® (<i>Folpet</i>): 80%
Coltura	Vite da vino e da tavola	
Patogeno controllato	<i>Plasmopara viticola</i>	
Metodo d'applicazione	Applicazione fogliare	
Numero d'applicazioni	2 applicazioni per stagione	
Dose d'applicazione ad ettaro	0,2 L/ha di Zorvec Zelavin® + 0,625 L/ha di Movida®	Per volumi d'acqua di 1000 L/ha: 0,2 L di Zorvec Zelavin® + 1,25 Kg di Flovine®
Volumi di acqua	300 - 1500 L/ha <i>In caso di volumi di acqua inferiori a 1000 L/ha rispettare la dose piena ad ettaro.</i>	
Dose d'applicazione ad ettolitro		20 ml/hl di Zorvec Zelavin® + 125 g/hl di Flovine® <i>In caso di volumi di acqua inferiori ai 1000 L/ha rispettare la dose piena ad ettaro. In caso di volumi di acqua superiori ai 1000 L/ha fare riferimento alla dose per ettolitro sopra indicata fino ad un massimo di 1500 L di acqua per ettaro.</i>
Intervallo applicativo	10 giorni	
Confezione co-pack	1 ha e 4 ha	4 ha

*Flovine®: Marchio registrato ADAMA GROUP

*ZOXAMIDE sostanza attiva originale di Gowan Crop Protection Limited. **Movida®**: marchio registrato Gowan Italia.


THIS CHANGES EVERYTHING

DuPont™
Zorvec Zelavin® Vel
disease control
DuPont™
Zorvec Zelavin® Bria
disease control

Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria: principali caratteristiche e benefici

NESSUNA RESISTENZA INCROCIATA

CON GLI ALTRI FUNGICIDI IN COMMERCIO



- Offre ai viticoltori un nuovo strumento per combattere la peronospora della vite.
- Assicura una migliore efficacia e una maggiore durata del controllo.

RESISTENZA AL DILAVAMENTO

DOPO MENO DI UN'ORA DALL'APPLICAZIONE



- Flessibilità d'applicazione: utile quando le condizioni climatiche ritardano l'epoca d'intervento.
- Evita di fare ripetere il trattamento in caso di pioggia.

PROTEZIONE

DEI NUOVI GERMOGLI



- Movimento sistemico acropeto verso foglie, germogli e grappoli.
- Essenziale per massimizzare la protezione della coltura e la sua resa.

- Nuova famiglia chimica
- Nuovo sito e nuovo meccanismo di azione.
- Nuovo gruppo FRAC
- Compatibilità fisica e chimica con i più noti agrofarmaci.
- Termostabile e fotostabile
- Spiccata attività biologica (EC50 bassissima).
- Alto coefficiente di ripartizione (3.67)
Elevatissima capacità di legarsi alle cere.
- Breve tempo di carenza
- Intervallo applicativo su vite di 10 gg.
- 2 applicazioni/anno per la vite da vino e tavola.

Gestione della resistenza

STRATEGIA	TATTICHE
Limitare l'esposizione	<ul style="list-style-type: none">- Limitare il numero d'applicazioni a un massimo di 2 a stagione e alternare con fungicidi a diverso meccanismo d'azione.- Preferire le applicazioni in blocchi di due a quelle alternate.- Applicare <u>preventivamente</u>.- Rispettare sempre l'intervallo d'applicazione raccomandato.
Rallentare la crescita del patogeno	<ul style="list-style-type: none">- Seguire il più possibile la profilassi- Applicare sempre Zorvec Zelavin® in miscela con Movida® o Flovine®.
Contenere gli isolati resistenti	<ul style="list-style-type: none">- Dopo i due trattamenti con Zorvec Zelavin® Vel o Zorvec Zelavin® Bria trattare con un prodotto a diverso meccanismo d'azione.- Utilizzare Zorvec Zelavin® Vel o Zorvec Zelavin® Bria nella prima metà della stagione.




Posizionamento tecnico



Elevata efficacia e persistenza d'azione


Foglia: media di 6 prove condotte in Italia su vite da vino nel 2016



Test di posizionamento con 2 applicazioni consecutive a 10 giorni d'intervallo dei prodotti del grafico nella fase della fioritura. Le fasi di pre-fioritura sono state trattate per tutte le tesi con 3 applicazioni di Cimoxanil + Mancozeb, quelle di post-fioritura con 3 applicazioni di Dimetomorf + Rame da solfato tribasico e successivamente con Idrossido di rame.

■ % controllo (INCIDENZA) su foglia. Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.
 ■ % controllo (SEVERITÀ) su foglia. Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.

Grappolo: media di 6 prove condotte in Italia su vite da vino nel 2016



Test di posizionamento con 2 applicazioni consecutive a 10 giorni d'intervallo dei prodotti del grafico nella fase della fioritura. Le fasi di pre-fioritura sono state trattate per tutte le tesi con 3 applicazioni di Cimoxanil + Mancozeb, quelle di post-fioritura con 3 applicazioni di Dimetomorf + Rame da solfato tribasico e successivamente con Idrossido di rame.

■ % controllo (INCIDENZA) su foglia. Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.
 ■ % controllo (SEVERITÀ) su foglia. Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

I dati contenuti nel presente documento si basano sulle più recenti informazioni tecniche a disposizione di DuPont™; DuPont™ si riserva il diritto di aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento. DuPont™ Zorvec® è un prodotto per il controllo delle malattie (oxathiapiprolin) non registrato per la vendita o l'uso in tutti i Paesi. È vietato mettere in vendita, vendere e utilizzare il prodotto senza le opportune registrazioni nazionali. Salvo indicazioni contrarie, i marchi commerciali contrassegnati da ®, ™ o SM sono marchi commerciali di DuPont™ o delle sue società affiliate. © 2017 DuPont.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.

Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

