

# TUAREG®

ERBICIDA PER SOIA ED ERBA MEDICA.  
LIQUIDO SOLUBILE

## TUAREG®

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono  
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Può provocare una reazione allergica. Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE, SORBITAN, MONOLAURATE, ETHOXYLATED



ATTENZIONE

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

### Distribuito da:

Du Pont De Nemours Italiana S.r.l., via Pontaccio, 10 – 20121 Milano

### Officina di produzione:

BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - 59820 Gravelines (Francia)  
TORRE s.r.l. - 53028 Torrenieri (SI)

### Officina di solo confezionamento:

IMPERIAL CHEMICAL LOGISTICS GmbH – D38300 Wolfenbüttel

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 12010 del 26.04.04

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 2,5 – 3 – 5 litri

### Partita n.

® Marchio registrato

### NORME DI SICUREZZA

Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Consultare un Centro Antiveneni.**

**ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### CARATTERISTICHE D'AZIONE

Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristemati) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle

erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

### SPETTRO D'AZIONE

Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp.* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Polygonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp.* (nàppola).

La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

**Erba medica**, impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha**,

**Soia** impiegare a **1 – 1,250 l/ha**.

Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha.

Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti.

In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

### EPOCA DI IMPIEGO

**Post-emergenza precoce:** su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

### FITOTOSSICITÀ

Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi).

Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.

**Avvertenza:** per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

**Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

### DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.**

**Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.**

### DA NON VENDERSI SFUSO

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**  
**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la**

**contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque  
dalle aziende agricole e dalle strade**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17.03.2008 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 05.12.2016.