

VYDATE® 5G

Nematocida in formulazione granulare

VYDATE 5G

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Oxamyl puro g 5
Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Tossico se ingerito (H301). Nocivo se inalato (H332). Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirare la polvere (P261). Lavare accuratamente mani e il viso dopo l'uso (P264). IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P301+310). IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione (P304+340). In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P312). Trattamento specifico (vedere le informazioni per il medico su questa etichetta) (P321). Sciacquare la bocca (P330). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay - Francia

Registrazione N. 6277 del 06.03.1985 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: kg 10 PARTITA N.:



PERICOLO

Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dell'umidità. Durante il trattamento tenere lontano persone non protette, animali ed il bestiame. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici:** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** atropina. **Controindicazioni:** ossime.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

VYDATE 5G è un nematocida in formulazione granulare contenente il 5% di principio attivo Oxamyl dotato di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto.

VYDATE 5G, applicato al suolo alle dosi indicate in etichetta, controlla i nematodi presenti nel terreno appartenenti ai generi *Heterodera*, *Globodera* e *Meloidogyne*, esplicando azione nematocida e nematostatica. VYDATE 5G deve essere distribuito in pre-trapianto o alla semina, con le comuni attrezzature utilizzate per lo spargimento dei granulari.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

Barbabietola da zucchero: VYDATE 5G è attivo contro nematodi radicali cisticoli del tipo *Heterodera schachtii*:

- trattamento alla semina con 30-40 kg/ha mediante sola applicazione sulla fila in localizzazione con il seme e successivo incorporamento nel terreno.

Patata precoce: contro nematodi radicali cisticoli del tipo *Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*:

- trattamento alla semina con 40 kg/ha mediante sola applicazione lungo il solco di semina e successivo incorporamento nel terreno.

Patata: contro nematodi radicali cisticoli del tipo *Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*:

- trattamento alla semina con 60-70 kg/ha mediante sola applicazione lungo il solco di semina e successivo incorporamento nel terreno.

- in pre-trapianto con 90-110 kg/ha distribuiti su tutta la superficie, avendo cura di interrare il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica;

- in pre-trapianto con 60-70 kg/ha localizzato lungo la fila, interrando il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica.

In ogni caso prima di iniziare lo spargimento avere cura di tarare l'attrezzatura in modo da distribuire esattamente la dose indicata.

Su pomodoro si raccomanda il dosaggio più alto nei terreni più pesanti e comunque in presenza di infestazioni elevate.

Carota: contro nematodi cisticoli del tipo *Heterodera carotae* e galligeni *tipo Meloidogyne spp.*:

- in pre-semina o alla semina con 50 kg/ha localizzato lungo il solco di semina interrando il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica.

Tabacco: contro nematodi galligeni *tipo Meloidogyne spp.*:

- in pre-trapianto con 60-70 kg/ha localizzato lungo la fila, interrando il prodotto a 10-15 cm, mediante incorporazione meccanica.

AVVERTENZA AGRONOMICA: si consiglia di seminare o trapiantare le colture di lattughe e simili, cavoli a testa ed a foglia e cipolla solo trascorsi 120 giorni dall'applicazione di VYDATE 5G.

COMPATIBILITA'

VYDATE 5G va impiegato da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 90 giorni per la patata precoce; non necessario per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

© Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 5 - kg 20

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 luglio 2015

Pomodoro (in coltura protetta): contro nematodi radicali galligeni del tipo *Meloidogyne incognita*;

NORME PRECAUZIONALI

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 15 m dai corpi idrici superficiali.

-Per proteggere gli uccelli selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi.

-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].