

# TALENDO®

Fungicida antioidico per la Vite da vino e la Vite da tavola.  
Concentrato emulsionabile.

## TALENDO

### COMPOSIZIONE

Proquinazid puro g 20.53 (=200 g/L)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene: Calcium dodecilbenzenesulfonato

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea (H315)  
Provoca gravi lesioni oculari (H318)  
Sospettato di provocare il cancro (H351) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201) Indossare guanti/indumenti

protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280) **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352) **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338) **IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313) Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P310) Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362) Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).**

### Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

### Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N° 12106 del 16.03.2007 del Ministero della Salute  
Contenuto netto: ml 50 – 100 – 200 – 250 – 500 litri 1- 2,5 - 5

PARTITA N.:



PERICOLO

### NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso – E' obbligatorio per l'operatore l'uso di dispositivi per la protezione degli occhi - Non riutilizzare gli imballi che contenevano il prodotto.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

### INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

- Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
- Contatto con la pelle:** in caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

### MODALITA' D'IMPIEGO

#### Caratteristiche di azione

TALENDO è un fungicida organico formulato in concentrato emulsionabile efficace contro l'Oidio della vite (*Uncinula necator*). TALENDO è dotato di attività preventiva ed agisce per contatto. TALENDO contiene proquinazid, principio attivo che agisce sulla germinazione delle spore inibendo la formazione degli appressori secondari; proquinazid appartiene alla famiglia chimica dei quinazolinoni.

### DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

#### VITE (da vino e da tavola):

TALENDO s'impiega alla dose di 20–25 ml di prodotto ogni 100 litri d'acqua (avendo cura di applicare comunque 200 ml/ha di prodotto con volumi d'acqua inferiori a 10 hl per ettaro).

A seconda delle attrezzature impiegate si possono utilizzare da 3 a 15 hl/ha, avendo cura di bagnare bene la vegetazione e i grappoli.

Applicare TALENDO ogni 10-14 giorni adottando l'intervallo più breve se le condizioni meteorologiche e agronomiche comportano rischi di gravi infezioni.

TALENDO può essere applicato a partire dallo stadio di tre foglie e fino alla invaiatura, rispettando l'intervallo di sicurezza di 28 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per ciclo culturale. Date le caratteristiche preventive del prodotto, si raccomanda di iniziare le applicazioni di TALENDO prima della comparsa dei sintomi di oidio.

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di TALENDO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**DA NON IMPIEGARE IN SERRA**

### AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- TALENDO deve essere applicato preventivamente
- Il numero massimo di applicazioni di TALENDO è di 3 per ciclo culturale, di cui non più di due consecutive
- Dove l'Oidio sia già presente, TALENDO deve essere impiegato in miscela od in successione ad un prodotto antioidico attivo sul micelio
- In un corretto programma di difesa antioidica, i trattamenti con TALENDO devono essere alternati con applicazioni di antioidici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

### COMPATIBILITA'

TALENDO è fisicamente compatibile con gli altri prodotti fitosanitari utilizzati su vite. Non sono attualmente noti casi di incompatibilità.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

### INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

**ATTENZIONE:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 16 metri dai corpi idrici superficiali.

**ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO– NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**Altra officina autorizzata:** Schirm GmbH Division Sifokan – Dieselstrasse 8, D-85107 Baar-ebenhausen, Germany

© Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10.09.2008 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.07.2014

**TALENDO®**Fungicida antiodico per la Vite da vino e la Vite da tavola.  
Concentrato emulsionabile.**TALENDO****COMPOSIZIONE**

Proquinazid puro g 20.53 (=200 g/L)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene: Calcium dodecilbenzenesulfonato

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Provoca irritazione cutanea (H315)  
Provoca gravi lesioni oculari (H318)  
Sospettato di provocare il cancro (H351) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201) Indossare guanti/indumenti

protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280) **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352) **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338) **IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313) Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P310) Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362) Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).**

**Titolare della Registrazione**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

**Officina di Produzione**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N° 12106 del 16.03.2007 del Ministero della Salute  
Contenuto netto: ml 50 - 100 - 200 - 250 - 500 litri 1- 2,5 - 5

**PARTITA N.:****PERICOLO****NORME PRECAUZIONALI**

Conservare il recipiente ben chiuso - E' obbligatorio per l'operatore l'uso di dispositivi per la protezione degli occhi - Non riutilizzare gli imballi che contenevano il prodotto.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

**INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:**

- d) **Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
- e) **Contatto con la pelle:** in caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- f) **Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- e) **Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

**MODALITA' D'IMPIEGO****Caratteristiche di azione**

TALENDO è un fungicida organico formulato in concentrato emulsionabile efficace contro l'Oidio della vite (*Uncinula necator*). TALENDO è dotato di attività preventiva ed agisce per contatto. TALENDO contiene proquinazid, principio attivo che agisce sulla germinazione delle spore inibendo la formazione degli appressori secondari; proquinazid appartiene alla famiglia chimica dei quinazolinoni.

**DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO****VITE (da vino e da tavola):**

TALENDO s'impiega alla dose di 20-25 ml di prodotto ogni 100 litri d'acqua (avendo cura di applicare comunque 200 ml/ha di prodotto con volumi d'acqua inferiori a 10 hl per ettaro).

A seconda delle attrezzature impiegate si possono utilizzare da 3 a 15 hl/ha, avendo cura di bagnare bene la vegetazione e i grappoli. Applicare TALENDO ogni 10-14 giorni adottando l'intervallo più breve se le condizioni meteorologiche e agronomiche comportano rischi di gravi infezioni.

TALENDO può essere applicato a partire dallo stadio di tre foglie e fino alla invaiatura, rispettando l'intervallo di sicurezza di 28 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale. Date le caratteristiche preventive del prodotto, si raccomanda di iniziare le applicazioni di TALENDO prima della comparsa dei sintomi di oidio.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di TALENDO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**DA NON IMPIEGARE IN SERRA**

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:**

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- TALENDO deve essere applicato preventivamente
- Il numero massimo di applicazioni di TALENDO è di 3 per ciclo colturale, di cui non più di due consecutive
- Dove l'Oidio sia già presente, TALENDO deve essere impiegato in miscela od in successione ad un prodotto antiodico attivo sul micelio
- In un corretto programma di difesa antiodica, i trattamenti con TALENDO devono essere alternati con applicazioni di antiodici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

**COMPATIBILITA'**

TALENDO è fisicamente compatibile con gli altri prodotti fitosanitari utilizzati su vite. Non sono attualmente noti casi di incompatibilità.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

**ATTENZIONE:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 16 metri dai corpi idrici superficiali.

**ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**Altra officina autorizzata:** Schirm GmbH Division Sifokan - Dieselstrasse 8, D-85107 Baar-ebenhausen, Germany

® Marchio registrato E.I. DuPont De Nemours & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10.09.2008 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.07.2014

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

**TALENDO<sup>®</sup>**

Fungicida antioidico per la Vite da vino e la Vite da tavola.  
Concentrato emulsionabile.

**TALENDO**

**COMPOSIZIONE**

Proquinazid puro g 20.53 (=200 g/L)  
Coformulanti q.b. a 100  
Contiene: Calcium dodecilbenzenesulfonato

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Provoca irritazione cutanea (H315) Provoca gravi lesioni oculari (H318) Sospettato di provocare il cancro (H351) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338) IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313) Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P310) Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362) Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391) Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

**Titolare della Registrazione**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

**Officina di Produzione**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N° 12106 del 16.03.2007 del Ministero della Salute  
Contenuto netto: ml 50 – 100 **PARTITA N.:**



**PERICOLO**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**Altra officina autorizzata:** Schirm GmbH Division Sifokan – Dieselstrasse 8, D-85107  
Baar-ebenhausen, Germany

© Marchio registrato E.I. DuPont De Nemours & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10.09.2008 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008,  
secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.07.2014