

ACANTO® PLUS

Fungicida a largo spettro per frumento (tenero e duro), orzo, segale, avena e triticale.
Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: Gruppi 11, 3 (FRAC)

ACANTO® PLUS Composizione

Picoxystrobin 200 g/L
Ciproconazolo 80 g/L
Coformulanti q.b. a 100
Contiene:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, può provocare una reazione allergica

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201).

Indossare guanti/indumenti protettivi (P280).

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico (P333+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare a temperature non superiori a 40°C (P401). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officine di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Phyteurop – Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne Montreuil Belay (France)

Registrazione N° 16437 del 26.02.2016 del Ministero della Salute

Contenuto netto: litri 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10

PARTITA e DATA:



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Per proteggere i lombrichi eseguire una lavorazione del terreno profonda almeno 20 cm

- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

- Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca e tenerlo a riposo. Potrebbe essere necessaria la respirazione artificiale e/o la somministrazione di ossigeno.
- Contatto con la pelle:** togliere prontamente gli indumenti contaminati direttamente a contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle o di reazione allergica contattare un medico. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, tenendo gli occhi aperti, risciacquare delicatamente con acqua per almeno 15-20 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito almeno che non venga suggerito dal medico o dal centro antiveleni. Se la persona è cosciente lavare la bocca con acqua. Non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione:

ACANTO PLUS è un fungicida ad ampio spettro per il controllo di diverse malattie fungine di frumento (tenero e duro), orzo, segale, avena e triticale, a base di picoxystrobin (strobilurina) e ciproconazolo (triazolo).

Picoxystrobin agisce inibendo la respirazione fungina; è dotato di attività sistemica e translaminare e possiede una significativa azione di vapore. Ciproconazolo inibisce la crescita del fungo bloccando la biosintesi dell' ergosterolo.

ACANTO PLUS deve essere applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

Frumento (tenero e duro), orzo, segale, avena e triticale: per il controllo di Ruggini, Septoria, Oidio, Elmintosporiosi, Rincosporiosi, e Ramularia applicare **0.75-1 l/ha** di ACANTO PLUS disciolto in 100-400 litri di acqua. Effettuare 1 o 2 applicazioni per anno utilizzando barre irroratrici ed intervenendo nel periodo compreso fra l'inizio levata (comparsa del primo nodo) e la fioritura. Rispettare un intervallo minimo di 21 giorni e massimo di 28 giorni tra le applicazioni.

INDIPENDENTEMENTE DAI FORMULATI UTILIZZATI, NON SUPERARE LA DOSE ANNUA DI 500 g DI PICOXYSTROBIN AD ETTARO.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, agitare la confezione del prodotto e versare la quantità desiderata di ACANTO PLUS direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente (almeno tre volte) il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ACANTO PLUS è una miscela di picoxystrobin (gruppo FRAC 11) e ciproconazolo (gruppo FRAC 3), sostanze attive aventi diverso meccanismo d'azione e pertanto rappresenta una buona soluzione per prevenire o ritardare l'insorgere di resistenze. Il prodotto deve essere applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia. È consigliabile alternare l'utilizzo di Acanto Plus con prodotti aventi differente modo d'azione. **Non effettuare con ACANTO PLUS più di 2 interventi all'anno.**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale, avena e triticale,

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07.10.2016