

FLOVINE

**Fungicida organico per la difesa di vite, pomodoro, floreali ed ornamentali
GRANULI IDRODISPERSIBILI**

MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO M4 (FRAC)

FLOVINE

Autorizzazione Ministero della salute n. 17111 del 22.01.2018

Composizione

Folpet puro 80 g
coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411- Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)– Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione e confezionamento:

ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva 84100 – Israele

Distribuito da:

Du Pont de Nemours Italiana srl - Milano

Contenuto: 5 kg

Partita n.



ATTENZIONE

prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 m per applicazioni su pomodoro; 14 m solo per applicazioni tardive su vite da ridursi a 5 m in presenza di una siepe in combinazione con:

- impiego di ugelli anti-deriva o
- applicazioni dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: FLOVINE è un fungicida ad azione principalmente preventiva ed è dotato di notevole persistenza d'azione. E' caratterizzato da un'azione multi sito di contatto e, pertanto, da un ridotto rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate di seguito si riferiscono a trattamenti eseguiti utilizzando irroratrici a volumi d'acqua pari a 1000 l/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume si raccomanda di aumentare le concentrazioni del prodotto in modo da assicurare lo stesso dosaggio per ettaro.

VITE (UVA DA VINO E DA TAVOLA):

Intervenire in vite da vino da ripresa vegetativa a invaiatura e in vite da tavola da ripresa vegetativa e pre-fioritura in vite da tavola come segue:

- **2 kg/ha (200 g/ha)** per la protezione da Escoriosi (*Phomopsis viticola*) e Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), intervenendo dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte.
- **1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/ha)** per la protezione da Peronospora (*Plasmopara viticola* anche in fase d'allevamento e in vivaio), iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
- **1,6-1,8 kg/ha (160-180 g/ha)** per la protezione da Marciume bianco (*Coniella diplodiella*), intervenendo tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.
- **1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/ha)** azione collaterale nei confronti di Oidio (*Erysipha necator*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Marciumi secondari (*Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.). Per la protezione da oidio si raccomanda la miscela con antioidici specifici intervenendo dalla pre-fioritura, mentre per il contenimento della Muffa grigia si consiglia di intervenire in pre-chiusura grappolo.

Eseguire non più di 10 trattamenti all'anno per uva da vino e non più di 4 trattamenti per uva da tavola con clima siccitoso ripetendoli ad intervalli di 7-10 giorni.

POMODORO (pieno campo e serra): 1,5 kg/ha (150 g/ha) contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternariosi (*Alternaria solani*), Cladosporiosi (*Fulvia fulva*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*); intervenire preventivamente, al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.

Non eseguire più di 3 trattamenti all'anno per colture in serra, e 4 per quelle in pieno campo.

FLOREALI E ORNAMENTALI: 2-3 kg/ha (200-300 g/ha) contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e marciumi radicali e basali e *Phytophthora* spp..

Preparazione della sospensione: stemperare il quantitativo stabilito di FLOVINE in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: FLOVINE è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali. Su FLOREALI e ORNAMENTALI eseguire applicazioni preliminari prima di effettuare il trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVA DA VINO ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 56 GIORNI PER UVA DA TAVOLA, 10 GIORNI PER POMODORO

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.01.2018”