

# MOVIDA®

Fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite da tavola e da vino  
SOSPENSIONE CONCENTRATA

## Composizione di MOVIDA® :

Zoxamide pura 21,8 % (240 g/L)  
Coformulanti e solventi q.b. a g 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto, il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## Titolare della Registrazione

GOWAN ITALIA S.r.l. Via Morgagni 68 – 48018 – Faenza  
Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17075 del 26/10/2017

## Distribuito da

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

## Stabilimenti autorizzati per la produzione

### e/o confezionamento:

Sipcam SpA– Salerano sul Lambro (Lo)

Taglie: 0,625-0,65-1-2,5-3-5 L Partita n.: vedere sigla sovraimpresa



**ATTENZIONE**



**Informazioni per il Medico:** Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

MOVIDA® è un antiperonosporico a base di *zoxamide*, s.a. appartenente al gruppo chimico delle benzamidi.

La s.a. ha elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l'asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.

MOVIDA® deve essere impiegato con applicazioni di tipo preventivo, al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Utilizzare volumi di irrorazione che consentano una completa ed omogenea bagnatura evitando fenomeni di sgocciolamento della vegetazione. Devono essere rispettati le dosi, il numero di trattamenti e l'intervallo fra i trattamenti come riportato in tabella.

**NUMERO DI TRATTAMENTI AUTORIZZATO E STRATEGIE ANTIRESISTENZA: vedi tabella in calce**

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

**Compatibilità:** MOVIDA® è generalmente compatibile con i prodotti di comune impiego. Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.

**Fitotossicità:** il prodotto nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):**

**CHEMTREC +1.703.527.3887**

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA	PATOGENO	STRATEGIE ANTIRESISTENZA	DOSE (L/Ha)	INTERVALLO FRA I TRATTAMENTI (giorni)	NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI	PERIODO DI CARENZA (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora ( <i>Plasmopora viticola</i> ) Un programma specifico di interventi antiperonosporici con MOVIDA®, applicato nelle fasi più critiche per gli attacchi della <u>botrite sul grappolo</u> ( <i>Botrytis cinerea</i> ) consente, come <b>effetto collaterale</b> , il parziale contenimento anche di questa pericolosa malattia.	Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione, anch'essi alla dose consigliata in etichetta	0,625-0,75	8 - 10	5 (massimo 3 consecutivi)	28