

# SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la  
barbabietola da zucchero e da foraggio.  
Granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione gruppo **B** (HRAC)

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
Triflurosulfuron metile p.a. puro 50 g  
Coformulanti q. b. a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di provocare il cancro (H351).  
Molto tossico per gli organismi acquatici  
con effetti di lunga durata (H410). Per  
evitare rischi per la salute umana e per  
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso  
(EUH401)

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini  
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare  
durante l'uso (P270). Indossare  
guanti/indumenti protettivi (P280). IN  
CASO di esposizione o di possibile  
esposizione, consultare un medico  
(P308+313). Raccogliere il materiale  
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da  
alimenti, bevande e mangimi animali  
(P401). Smaltire il prodotto/recipiente in  
conformità con le normative vigenti (P501).

## Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

## Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia  
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100

PARTITA N:



ATTENZIONE

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

## MODALITA' DI IMPIEGO

**Caratteristiche tecniche:** SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

## EFFICACIA ERBICIDA

**Infestanti sensibili:** *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Galium aparine* (Attaccamani), *Polygonum aviculare* (Corregiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis alba* (Senape bianca), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Grespino), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Veronica hederifolia* (Veronica a foglie d'edera).

Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di sviluppo (2-3 foglie vere).

**DOSE D'IMPIEGO:** 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es. Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. La dose maggiore è consigliata quando il prodotto è impiegato da solo per il controllo di *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum* ed *Abutilon theophrasti*.

SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti non sensibili al prodotto è opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

**EPOCA D'IMPIEGO:** Post emergenza della coltura e delle infestanti.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.

È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

- 1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
- 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
- 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
- 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.

5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.

SAFARI è poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.

Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.

In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, è possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.

## PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

**COMPATIBILITA':** SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** non necessario

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO .**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

**SAFARI®**

Erbicida di post-emergenza selettivo per la  
barbabietola da zucchero e da foraggio.  
Granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione gruppo **B** (HRAC)

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:  
Triflusaluron metile p.a. puro 50 g  
Coformulanti q. b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Sospettato di provocare il cancro (H351).  
Molto tossico per gli organismi acquatici  
con effetti di lunga durata (H410). Per  
evitare rischi per la salute umana e per  
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso  
(EUH401)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini  
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare  
durante l'uso (P270). Indossare  
quantum/indumenti protettivi (P280). IN  
CASO di esposizione o di possibile  
esposizione, consultare un medico  
(P308+313). Raccogliere il materiale  
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da  
alimenti, bevande e mangimi animali  
(P401). Smaltire il prodotto/recipiente in  
conformità con le normative vigenti (P501).

**Titolare della Registrazione**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

**Officina di Produzione**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia  
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

**Contenuto netto: g 100** **PARTITA N:**



ATTENZIONE

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

**MODALITA' DI IMPIEGO**

**Caratteristiche tecniche:** SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

**EFFICACIA ERBICIDA**

**Infestanti sensibili:** *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Galium aparine* (Attaccamani), *Polygonum aviculare* (Corregiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis alba* (Senape bianca), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Grespino), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Veronica hederifolia* (Veronica a foglie d'edera).

Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di sviluppo (2-3 foglie vere).

**DOSE D'IMPIEGO:** 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es. Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.

La dose maggiore è consigliata quando il prodotto è impiegato da solo per il controllo di *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum* ed *Abutilon theophrasti*.

SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti non sensibili al prodotto è opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

**EPOCA D'IMPIEGO:** Post emergenza della coltura e delle infestanti.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.

È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

- 1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
- 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
- 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
- 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.

5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:**

Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.

SAFARI è poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.

Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.

In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, è possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.

**PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA**

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

**COMPATIBILITA':** SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** non necessario

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO .**

© Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

**Altre taglie autorizzate:** g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

# SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio.

Granuli idrodispersibili

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:  
Triflusaluron metile p.a. puro 50 g  
Coformulanti q. b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi animali (P401). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

**Titolare della Registrazione**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

**Officina di Produzione**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia  
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

**Contenuto netto: g 100**

**PARTITA N.:**



ATTENZIONE

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE**

**Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250**

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....*

# SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo  
per la barbabietola da zucchero e da foraggio.  
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
Triflusaluron metile p.a. puro 50 g  
Coformulanti q. b. a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di provocare il cancro (H351).  
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi animali (P401). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

## Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

## Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia  
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 30

PARTITA N:



ATTENZIONE

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

## MODALITA' DI IMPIEGO

**Caratteristiche tecniche:** SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

## EFFICACIA ERBICIDA

**Infestanti sensibili:** *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Galium aparine* (Attaccamani), *Polygonum aviculare* (Corregiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis alba* (Senape bianca), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Grespino), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Veronica hederifolia* (Veronica a foglie d'edera).

Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di sviluppo (2-3 foglie vere).

**DOSE D'IMPIEGO:** 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es. Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.

La dose maggiore è consigliata quando il prodotto è impiegato da solo per il controllo di *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum* ed *Abutilon theophrasti*.

SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti non sensibili al prodotto è opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

**EPOCA D'IMPIEGO:** Post emergenza della coltura e delle infestanti.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.

E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

- 1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
- 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
- 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
- 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
- 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.

SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.

Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.

In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.

## PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

**COMPATIBILITA':** SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** non necessario

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO .**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.

## Altre taglie autorizzate:

- g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
- g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
- g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

## ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

# SAFARI®

**Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio.**  
**Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile**

**COMPOSIZIONE:**  
100 grammi di prodotto contengono:  
Triflusaluron metil p.a. puro 50g  
coformulanti q. b. a 100

**Titolare della Registrazione**  
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337  
**Officina di Produzione**  
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

Registrazione N. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

**Contenuto netto del sacchetto: 30 g**

**AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione**

**NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI  
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE  
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE**

**ATTENZIONE**

### Altre taglie autorizzate:

- g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)
- g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
- g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....*

### MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

**ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:** il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.